

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort, entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.



| IMPfung  | ALTER | in Wochen:      |   | in Monaten |      |                 |     |    |       |    | in Jahren |     |        |                 |                 |       |     |       |                 |   |    |                 |                 |
|--|-------|-----------------|---|------------|------|-----------------|-----|----|-------|----|-----------|-----|--------|-----------------|-----------------|-------|-----|-------|-----------------|---|----|-----------------|-----------------|
|  |       | 6               | 2 | 3          | 4    | 5-10            | 11* | 12 | 13-14 | 15 | 16-23     | 2-4 | 5-6    | 7-8             | 9-14            | 15-16 | 17  | ab 18 | ab 60           |   |    |                 |                 |
|  |       | U4              |   | U5         |      |                 | U6  |    |       |    | U7        |     | U7a/U8 |                 | U9              |       | U10 |       | U11/11          |   | J2 |                 |                 |
| Rotaviren  |       | G1 <sup>a</sup> |   | G2         | (G3) |                 |     |    |       |    |           |     |        |                 |                 |       |     |       |                 |   |    |                 |                 |
| Tetanus <sup>b</sup>                             |       | G1              | N | G2         | N    | G3 <sup>c</sup> |     |    |       | N  |           |     | A1     | N               | A2              | N     |     |       | A <sup>e</sup>  |   |    |                 |                 |
| Diphtherie <sup>b</sup>                          |       | G1              | N | G2         | N    | G3 <sup>c</sup> |     |    |       | N  |           |     | A1     | N               | A2              | N     |     |       | A <sup>e</sup>  |   |    |                 |                 |
| Keuchhusten <sup>b</sup><br>Pertussis            |       | G1              | N | G2         | N    | G3 <sup>c</sup> |     |    |       | N  |           |     | A1     | N               | A2              | N     |     |       | A3 <sup>e</sup> | N |    |                 |                 |
| Hib <sup>b</sup><br>Haemophilus influenzae Typ b |       | G1              | N | G2         | N    | G3 <sup>c</sup> |     |    |       | N  |           |     |        |                 |                 |       |     |       |                 |   |    |                 |                 |
| Kinderlähmung <sup>b</sup><br>Poliomyelitis      |       | G1              | N | G2         | N    | G3 <sup>c</sup> |     |    |       |    | N         |     |        |                 | A1              |       |     |       | N               |   |    |                 |                 |
| Hepatitis B <sup>b</sup>                         |       | G1              | N | G2         | N    | G3 <sup>c</sup> |     |    |       |    |           |     | N      |                 |                 |       |     |       |                 |   |    |                 |                 |
| Pneumokokken <sup>b</sup>                        |       | G1              | N | G2         | N    | G3 <sup>c</sup> |     |    |       | N  |           |     |        |                 |                 |       |     |       |                 |   |    | S <sup>g</sup>  |                 |
| Meningokokken C                                  |       |                 |   |            |      |                 |     | G1 |       |    |           |     |        | N               |                 |       |     |       |                 |   |    |                 |                 |
| Masern   |       |                 |   |            |      | G1              | N   |    | G2    |    |           |     |        | N               |                 |       |     |       |                 |   |    | S <sup>f</sup>  |                 |
| Mumps, Röteln                                    |       |                 |   |            |      | G1              | N   |    | G2    |    |           |     |        | N               |                 |       |     |       |                 |   |    |                 |                 |
| Windpocken<br>Varizellen                         |       |                 |   |            |      | G1              | N   |    | G2    |    |           |     |        | N               |                 |       |     |       |                 |   |    |                 |                 |
| HPV<br>Humane Papillomviren                      |       |                 |   |            |      |                 |     |    |       |    |           |     |        | G1 <sup>d</sup> | G2 <sup>d</sup> | N     |     |       |                 |   |    |                 |                 |
| Herpes zoster                                    |       |                 |   |            |      |                 |     |    |       |    |           |     |        |                 |                 |       |     |       |                 |   |    | G1 <sup>h</sup> | G2 <sup>h</sup> |
| Grippe<br>Influenza                              |       |                 |   |            |      |                 |     |    |       |    |           |     |        |                 |                 |       |     |       |                 |   |    |                 | S<br>(jährlich) |

Nächste Impftermine



### ERLÄUTERUNGEN

- G** GRUNDIMMUNISIERUNG (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)
- S** STANDARDIMPfung
- A** AUFRISCHIMPfung
- N** NACHHOLIMPfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)
- U** Früherkennungsuntersuchung
- J** Jugenduntersuchung (J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
- b** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- c** Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- d** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter  $\geq$  15 Jahren oder bei Impfabstand von  $<$  5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.
- e** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

- f** Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen  $\geq$  18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.
  - g** Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.
  - h** Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
- \* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.